



Black-cheeked Lovebird (*agapornis nigrigenis*)

Verspreiding: Suid-wes Zambia

Grote: 13.5cm (5")

Gewig: 45 gr.

Akkommodasie: Klein tot groot hokke wat binne en buiten huis opgerig kan word

Dieet: Saadmengsel vir klein parkiete

Legsels: 4-8 wit eiers (Meervoudige legsels)

Inkubasie: 23 dae

Speenouderdom: 38+14 dae

Natuurlike status: Algemeen

Gevangenskap: Goed gevestig wêreld wyd

Vlak van kundigheid: Beginner

Mutasie: Groot verskeidenheid

Groen (Gr): Dominant

Algehele voorkoms(20)

Plasing tot die sitstok(10)

Kop en bolyf

Voorkop, Bors, Wange en Keel(10)

Oë(5)

Snawel(5)

Kroon, Hals, Nek(10)

Vlerke en onderlyf

Laer-bors, Maag, Dye en Anale area(10)

Vlerk-en-vlugvere(10)

Mantel, Rug en Romp(10)

Stert(5)

Pote en naels(5)

Broei:

Vererwing:

Gr x Gr: 50% Gr (M)

Wel gerond, kort en 'n fyner voorkoms wat regop, weg van die stok staan.

+/- 70°

Kop fyner, gerond wat aansluit by 'n minder sterk nek. Voorkop roesbruin, wange en keel swart met n oranje-rooi kol op die bors (geen teken van geel).

Rond omring deur 'n wit oogring vry van vere of letsels; Oog donker bruin in kleur.

Rooi sonder letsels met verbleking aan basis kant.

Naak wit vel wat snawel afrond teen die kop.

Kroon roesbruin wat oorgaan in donker bruin en olyfgroen nek.

Goed gerond en liggroen

Vlerke dof grasgroen, 'n donkerder groen as die lyf asook swart vlugvere met groen buite rante; Punte wat raak

Breed en sterk; rug en romp dof grasgroen.

Groen aan die onder kant en boonste 1/3 Groen; Middelste Oranje-geel en swart; laer 1/3 bleek liggroen met groen punte

Pote grys van kleur, reguit sonder letsels met donker grys naels aan elke toon

Enkel paar of kolonie saam gevoeg waar beide die neskas uitvoer met repe blare en 4-6 wit eiers lê

50% Gr (W)




Violetgroen (L) en Violetblou (R) en nie groen Roesbruin voorkop wat oorgaan in donker bruin in die groen voël en grys in blou voël ontbreek

Goeie voorbeeld van groen kuikens wat na verveer die helder kleure sal ontwikkel – die roesbruin voorkop



Let op na die verbleking op die snawel. Die roesbruin voorkop is nog nie sigbaar nie.

Die verbleking op die snawel is minder sigbaar by volwasse voëls. Die pied mutasie beklemtoon die voorkop deur te verhelder na n roesrooi kleur.



Veerkwaliteit swak op bors. Roesbruin voorkop swak gedefinieer. Voël (L) toonnael weg

Mooi skoon romp. Kop bietjie plat. Roesbruin voorkop en donker bruin kroon ontbreek. Veerkwaliteit nie 100% Vlerke hang Donker kleur-faktor aanwesig

