



Fischer's Lovebird (*agapornis fischeri*)

Verspreiding: Noord Tanzania

Grote: 14cm (5.5")

Gewig: 50 gr.

Akkommodasie: Klein tot groot hokke wat binne en buiten huis opgerig kan word

Dieet: Saadmengsel vir klein parkiete

Legsels: 4-8 wit eiers (Meervoudige legsels)

Inkubasie: 23 dae

Speenouderdom: 38+14 dae

Natuurlike status: Algemeen

Gevangenskap: Goed gevestig wêreld wyd

Vlak van kundigheid: Beginner

Mutasie: Groot verskeidenheid

Groen (Gr): Dominant

Algehele voorkoms(20)

Plasing tot die sitstok(10)

Kop en bolyf

Voorkop, Bors, Wange en Keel(10)

Oë(5)

Snawel(5)

Kroon, Hals, Nek(10)

Vlerke en onderlyf

Laer-bors, Maag, Dye en Anale area(10)

Vlerk-en-vlugvere(10)

Mantel, Rug en Romp(10)

Stert(5)

Pote en naels(5)

Broei:

Vererwing:

Gr x Gr: 50% Gr (M)

Wel gerond, kort en growwer voorkoms wat regop, weg van die stok staan.

+ - 70°

Kop groot, gerond wat aansluit by 'n breë sterk nek.

Oranje-rooi sonder enige donker skaduwees

Rond omring deur 'n wit oogring vry van vere of letsels;

Oog donker bruin in kleur.

Rooi sonder letsels of verbleking aan basis kant. Naak

wit vel wat snawel afrond teen die kop

Olyfgroen wat oorgaan in olyfgeel

Goed gerond en liggroen

Groen, 'n donkerder groen as die lyf

Swart met groen buite rante; Punte wat raak sonder om die romp te bedek.

Breed en sterk; rug groen en romp violet blou

Stertvere groen onder en die boonste 1/3 Groen;

Middelste Oranje-geel en swart; laer 1/3 bleek liggroen met blou punte

Pote grys van kleur, reguit sonder letsels

Naels donker grys aan elke toon


Enkel paar of kolonie saam gevoeg waar beide die

neskas uitvoer met reepe blare en 4-6 wit eiers lê

50% Gr (W)



Duidelike band sonder enige geel soom onder
 Rooi-oranje van gesig kan bietjie rooier wees
 Duidelike skeiding tussen rooi voorkop en
 olyfgroen kroon wat nie te donker mag wees nie
 Wit oogring sonder enige letsels
 Pote wat sterk vasvat en omkrul om sitstok
 Pote grys van kleur, sonder gebreke
 Naels donker grys en ideale lengte



Regter voël toon ideale stand tot die sitstok
 Regter voël toon 'n mooi reguit ruglyn
 Regter voël se vlerkpunte raak sonder om te kruis
 Regter voël se stuitjie is nie violetblou
 Regter voël toon 'n tekort aan vlugvere
 Regter voël toon geen olyfgroen kroon wat
 oorloop in 'n olyfgeel nek nie
 Regter voël toon tekens van 'n donker faktor
 Linker voël se pote is te wyd geplaas
 Beide voëls toon 'n gebrek aan Oranje-rooi op die
 bors met oormatige geel wat oorloop op die nek



Beide voëls toon tekens van die Pied faktor,
 die sogenaamde Sablehead wat die donker
 pigment in die kop verwyder.
 Beide voëls toon die donker faktor
 Linker voël se vlerke kruis
 Linker voël se stert is geel